WIKIPEDIA

Therizinosauroidea

De **Therizinosauroidea** zijn een groep dinosauriërs behorende tot de Therizinosauria.


In 1954 impliceerde Malejew een superfamilie Therizinosauroidea door zijn benoeming van een familie Therizinosauridae.

De eerste definitie als klade werd in 2001 gegeven door Zhang: alle vormen nauwer verwant aan *Therizinosaurus* dan aan *Ornithomimus*, *Oviraptor* , *Velociraptor* en Neornithes. Deze definitie is een synoniem van Therizinosauria *sensu* Sereno.







In 2004 kwam Clark met een nauwere definitie die geformaliseerd werd door Paul Sereno in 2005: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van *Therizinosaurus cheloniformis* en *Beipiaosaurus inexpectus* en al zijn afstammelingen.

Bekende soorten zijn *Beipiaosaurus*, *Falcarius*, *Suzhousaurus*, *Alxasaurus*, *Nanshiungosaurus*, *Enigmosaurus*, *Erliansaurus*, *Erlikosaurus*, *Neimongosaurus*, *Nothronychus*, *Segnosaurus* en *Therizinosaurus*

Een analyse van Senter in 2007 gaf dit kladogram:



Afbeeldingengalerij

				
Erlikosaurus	segnosaurusnest	*Nothronychus*	In het ei groeide een therizinosauroïde mogelijk zéér snel	twee nanshiungosauruss en
				
Beipiaosaurus	*Suzhousaurus*	*Enigmosaurus*	*Segnosaurus*	

 Zie de categorie ***Therizinosauroidea*** van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

 Wikispecies heeft een pagina over ***Therizinosauroidea***.
